

**PŘÍBALOVÁ INFORMACE**  
**MP 10 FUM 24 mg/ml roztok pro ošetření včelstva fumigací**

**1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE**

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.  
Máslovice - Dol 94  
252 66 Libčice n. Vlt.  
tel. 220941259, e-mail: beedol@beedol.cz

**2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

MP 10 FUM 24 mg/ml roztok pro ošetření včelstva fumigací  
Tau-fluvalinatum

**3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK**

1 ml světle hnědého roztoku obsahuje:

Léčivá látka:

Tau-fluvalinatum 24 mg/ml

Ostatní látky:

Metylester řepkového oleje 812 mg/ml

Alkylsulfonát (C8 – C18) sodný 54 mg/ml

Pro aplikaci fumigací:

Proužek z krátkovláknité buničiny, impregnovaný směsí dusičnanů.

**4. INDIKACE**

MP 10 FUM je určen k léčení varroázy včel v době, kdy ve včelstvu není zavíčkovaný plod nebo jeho plochy jsou zanedbatelné. Přípravek působí kontaktně. Léčivá látka (tau-fluvalinát) se rozšiřuje v úlovém prostoru kouřem ze zapálených proužků. Postihuje roztoče *Varroa destructor* přítomné na dospělých včelách. Do zavíčkovaných plodových buněk neproniká. Pro včely je poměrně bezpečný při dotyku a inhalaci. Hubí také včelomorky (*Braula coeca*).

**5. KONTRAINDIKACE**

Nepoužívá se v době možného výskytu snůšky od 16.dubna do 30.září.

**6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**


Nežádoucí účinky na včelstva ani interakce s jinými léčivy nejsou známy.

**7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT**

Včelstva včely medonosné (*Apis mellifica*).

**8. DÁVKOVÁNÍ, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ**

Fumigace se provádí při venkovní teplotě nad + 10°C v době, kdy včely nelétají. Před aplikací přípravku se pláсты v úlu upraví tak, aby mezi krycím plástem a stěnou úlu vznikla asi 4 cm mezera. U nástavkových úlů se proužek vkládá do horního nástavku. V dodaném proužku papíru proděravíme otvor asi 1 cm od vrchního okraje. Těsně před ošetřením se nakape z výše 3 cm na horní polovinu proužku (blíže k otvoru) MP 10 FUM. Na jeden nástavek se použijí 2 kapky, obsedá-li včelstvo více nástavků, na proužek se nakapou max. 4 kapky. Po vsáknutí MP 10 se proužek na celé spodní straně zapálí.



## **9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ**

Potřebné množství MP 10 FUM odměřujeme kapáním. Lékovku opatrně naklánějte tak, aby se samovolně uvolnila vždy jen jedna kapka.

V případě vzplanutí okamžitě plamen sfoukneme. Doutnající proužek připevníme ve svislé poloze hřebíkem do poloviny krycího plástu (do vosku) tak, aby byl proužek vzdálen 2 cm od plástu a 2 cm od stěny úlu. Úl a česno uzavřeme na 30 min. Po dobu uzávěry česna včelstva kontrolujeme. V době uzávěry česna se může u jednotlivých včelstev projevit silnější vzrušení včel provázené silnějším hučením. Jde o individuální reakci včelstva. V takovém případě ihned otevřeme česno.

Je-li MP 10 FUM použit k diagnostickým účelům, vkládá se před aplikací přípravku na celé dno úlu podložka. Ta se za 12-24 hodin po aplikaci ze včelstva odstraní a veškerý spad z podložky zašle k vyšetření. Za hodinu po aplikaci odstraníme z krycího plástu hřebík a překontrolujeme, zda proužek shořel. V případě jeho zhasnutí opakujeme ošetření včelstva.

## **10. OCHRANNÁ LHŮTA**

Med - bez ochranných lhůt.

## **11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před chladem a mrazem.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na etiketě.

## **12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Přísně dodržujte dávkování. Předávkování vyvolá zvýšené vzrušení až hynutí včel.

Přípravek obsahuje pyrethroidy. Osoby se známou přecitlivělostí k pyrethroidům by se měly vyhnout kontaktu s veterinárním přípravkem. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky, skládající se z gumových rukavic, brýlí a respirátoru s chemickou vložkou A1. Při nechtěném kontaktu přípravku s kůží zasažené místo omyjte vodou a mýdlem. Vyvarujte se dotyku sliznic a očí kontaminovanou rukou. Při nástupu alergické reakce, např. po vdechnutí kouře, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

## **13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODNĚNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU**

Přípravek obsahuje syntetický pyrethroid tau-fluvalinát, který je toxický pro vodní organizmy. Nespotřebované zbytky a výplachy se vylévají do půdy, nesmí zasáhnout vodní zdroje ani veřejnou kanalizaci. Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku musí být likvidován podle místních právních předpisů.

## **POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE**

Srpen 2009

## **15. DALŠÍ INFORMACE**

Doba použití je vyznačena na etiketě lahvičky.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Jedno balení obsahuje lékovku s 5 ml přípravku a 50 fumigantními proužky.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. Údaje potřebné ke kontaktu najdete v bodu č. 1 tohoto dokumentu.