

## Formidol 41 g proužky do úlu

Reg. č.: 99/051/09-C

Odparná deska  
je umístěna v regulační  
fólii s 5 odpařovacími otvory.



## Formidol 81 g proužky do úlu

Reg. č.: 96/044/14-C

Proužek je opatřen  
čtyřmi odpařovacími  
otvory a závěsným okem.



Proužky do úlu *Formidol* jsou tvořeny odparnou deskou, která je napuštěna 85% kyselinou mravenčí (*Acidum formicum*).

Páry kyseliny mravenčí ničí hlavně foretické roztoče na včelách a částečně i jejich vývojová stadia pod víčky plodových buněk. Tím se předchází přemnožení roztočů ve včelstvu.

Zároveň ničí spory hub *Nosema sp.* a *Ascosphaera apis* na plástech. Stimuluje čistící pud včel. Plod napadený zvápenatěním je po aplikaci kyseliny mravenčí včelami odstraňován intenzivněji.

Stabilní teplota okolního prostředí zajistí rovnoměrný odpar léčivé látky z proužků.

Vysoká vzdušná vlhkost odpar léčivé látky snižuje.

## Kde se dozvědět více?

Další informace naleznete na našich webových stránkách [www.beedol.cz](http://www.beedol.cz) a v příručce *Celý rok proti varroáze*.

Přihlaste se na náš každoroční kurz *Preventivní a léčebné postupy v chovu včel*.

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Dol 94, 252 66 Mázlovice

+420 220 940 480

+420 734 858 244

Objednávky:

[leciva@beedol.cz](mailto:leciva@beedol.cz)



VÝZKUMNÝ ÚSTAV  
VČELAŘSKÝ

## Proužky do úlu Formidol

odpárné desky s kyselinou  
mravenčí proti roztočům *Varroa*

vhodné pro ekologické zemědělství

tlumí i nose mózu a zvápenatění  
včelího plodu



[www.beedol.cz](http://www.beedol.cz)

Gabon  
pro ochranu  
dlouhověkých včel

odstranění plodu, aby  
ošetření bylo účinné

tři aplikace  
Varidolu fumigací  
nebo aerosolem

očistění a vracení  
podložek

sběr melli  
napadané  
za 30 dnů

výšetření zimní  
melli

nátěr M-1 AER

Formidol

tvorba oddělků

monitoring  
moučkovým cukrem  
nebo ze spadu na dně

odstranění posledního  
trubčího plodu

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII


Ošetření je nejvhodnější provést při denních teplotách nad 20 °C a pokud nejsou vysoké rozdíly mezi denní a noční teplotou.

*Formidol* aplikujte v době, kdy v úlu není med pro lidskou konzumaci. Ideální doba je po medobraní, případně v bezsnůškovém období.

Monitorujte spad roztočů buď na podložkách, nebo metodou posypu cukrem.

Před aplikací *Formidolu* omezte velikost česna na 20 cm<sup>2</sup> a varroadno překryjte podložkou.


Za vyšších denních teplot aplikujte ve večerních hodinách.



Pokud proužky použijete za vysokých teplot nebo u úlů s malým česnem, hrozí silnější rozrušení včelstev, včely se začnou hrnout z česna ven.


Poškození včelstva při silnějším rozrušení je možno předejít jednorázovým odvětráním úlového prostoru nebo zvětšením česna.

Při práci s proužky *Formidol* používejte vždy ochranné pomůcky! Gumové rukavice a ochranné brýle jsou nezbytností. Kyselina mravenčí je žíravina a při styku s kůží způsobí popáleniny.




Dodržujte dávkování a aplikaci podle příbalové informace.


## Formidol 41 g




Vložte do podmetu očištěnou monitorovací podložku.




Na jedno včelstvo použijte 1 desku.



Desku v regulačním obalu vyjměte ze sáčku.



Umístěte desku orazítkovanou stranou směrem do úlu. Ujistěte se, že odporné otvory směřují přímo do uliček.



Po 48 hodinách vyjměte desku z regulačního obalu a vraťte ji na původní místo.


Z desky se tak rychle odpaří zbytek účinné látky. Na druhý den desku vyjměte, jinak včely desku rozkoušou a ztíží se Vám monitoring spadu roztočů.




Druhý den sledujte léčebný spad roztočů na podložku. Podle spadu roztočů uvažujte o opakování léčby. V případě spadu více než 50 roztočů léčbu po 1 týdnu zopakujte.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek, k dostání v dobrých včelařských obchodech.

## Máte včelstva daleko? Formidol 81 g



Vložte do podmetu očištěnou monitorovací podložku.




1 nástavek s plodem - 1 proužek, 2–3 nástavky s plodem - 2 proužky




V horním nástavku s plodem vyjměte krajní plást.


Pláсты posuňte tak, aby se za plodem nacházel jeden zásobní plást a za ním vznikla mezera pro zavěšení proužku *Formidol*.



Vyjměte proužek z obalu a zavěste na latku, ...



Laťka se zavěšeným proužkem *Formidol 81 g* umístěte do mezery ...



a uzavřete úl.

Proužek ponechte v úlu po dobu 12 dnů, poté jej vyjměte. Průběžně sledujte léčebný spad roztočů. V případě spadu více než 100 roztočů léčbu po 1 týdnu zopakujte.